

3. Clef de reconnaissance et types de prairies de fauche

Physionomie des graminées dominantes	Feuilles fines ou chétives en tapis			Feuilles moyennes à larges en tapis			Feuilles moyennes à larges peu diversifiées et le plus souvent en touffes					
Abondance des dicotylédones non légumineuses	Elevé (50-70 %)	Moyen (30-50 %)		Moyen (30-50 %)	Faible (10-30%)		Moyen (30-50 %)				Faible (10-30 %)	
Espèces principales voire dominantes	Dico. diversifiées : renouée, trolle, narcisse, cumin, pimprenelle officinale	Petite pimprenelle et rhinanthé à basse altitude ; à 1000 mètres grand boucage, renouée, géranium des bois, salsifis des prés	Dominance Brome dressé	Avec graminées variées	Avec graminées variées	Pâturin abondant	Géranium abondant	Renoncule acre abondante	Pissenlit abondant	Rumex abondant	Ombellifères abondantes	Dactyle et fléole abondants
Types	TYPE 1 Feuilles fines et dicotylédones variées 	TYPE 2 Feuilles fines et dicotylédones moyennement abondantes 	TYPE 3 À brome dressé 	TYPE 4 Gram à feuilles moyennes et dicotylédones diversifiées 	TYPE 5 Gram à feuilles moyennes 	TYPE 6 À pâturin 	TYPE 7 À géranium 	TYPE 8 À renoncules 	TYPE 9 À pissenlit 	TYPE 10 À rumex 	TYPE 11 À ombellifères 	TYPE 12 À feuilles larges 
Intérêt principal										aucun		
Page	9 / 10	11 / 12	13 / 14	15 / 16	17 / 18	19 / 20	21 / 22	23 / 24	25 / 26	27 / 28	29 / 30	31 / 32



RICHESSSE FLORISTIQUE



35-55



25-35



=<20

SOUPLESSE



bonne



moyenne



faible

APPÉTENCE



bonne



moyenne



faible

RENDEMENT



élevé




moyen à élevé



faible

4. Dynamique des prairies : changement d'un type à l'autre

Sous l'effet des pratiques des agriculteurs ou des ouvertures du tapis d'herbe par les animaux, la végétation change. Le diagramme ci-dessous présente de façon synthétique le passage d'un type de prairie à l'autre. Pour plus de précisions sur la dynamique végétale, se reporter aux fiches présentant chacun des types de prairie



Dynamique des prairies : les erreurs à éviter

Les très fortes fertilisations (40 à 50 m3 de lisier/ha/an) ont un effet rapide en un à deux ans. Elles favorisent les grandes graminées (type 12 à graminées à feuilles larges), mais aussi les rumex, les pissenlits. La biodiversité diminue très rapidement. Associer une forte fertilisation brûlant la végétation à une fauche précoce peut avoir un effet désastreux dès l'année suivante et se traduire par l'explosion du rumex, des ombellifères. Les conséquences sont difficiles à rattraper, revenir d'un type à rumex à une végétation de meilleure valeur agricole et environnementale peut demander une dizaine d'années voire davantage.

La fauche précoce (avant ou au début de la sortie des épis de graminées) répétée agit en trois à quatre ans. Elle favorise les graminées, mais aussi le pissenlit. Le nombre d'espèces chute également très vite. Le rétablissement de la biodiversité initiale est toujours long parfois impossible. En cas de précocité des fauches, tempérer les effets en variant la date de coupe selon les parcelles et selon les années.

